ЛП-№(011156)-(РГ-RU) от 31.07.2025

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 23.07.2025 № 18369
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Листок-вкладыш – информация для пациента

Диспорт®, 125 ЕД, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций

Действующее вещество: ботулинический токсин типа А – гемагглютинин комплекс.

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Сохраните этот листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.
- Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Диспорт®, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата Диспорт®.
3. Применение препарата Диспорт®.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Диспорт®.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. Что из себя представляет препарат Диспорт®, и для чего его применяют

Препарат Диспорт® относится к группе препаратов, называемых миорелаксантами периферического действия и содержит активное вещество ботулинический токсин типа А – гемагглютинин комплекс.

Для чего используется препарат Диспорт®

Препарат Диспорт® показан взрослым пациентам для лечения следующих расстройств:

- блефароспазм;
- гипергидроз подмышечной области;
- временное улучшение внешнего вида гиперкинетических складок (мимических морщин) лица от умеренной до выраженной степени у взрослых пациентов моложе 65 лет, когда выраженность этих морщин оказывает серьезное психологическое влияние на пациента.

Способ действия препарата Диспорт®

Препарат Диспорт® содержит токсин, вырабатываемый бактерией *Clostridium botulinum.* Данный токсин блокирует высвобождение такого нейромедиатора как ацетилхолин, нарушая, таким образом, нервно-мышечную передачу и приводит к снижению сократительной способности мышцы. Данный эффект помогает сократить аномальные мышечные сокращения, спазмы, а также помогает снижению мышечного тонуса.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 23.07.2025 № 18369
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Препарат Диспорт® также может использоваться для предотвращения сокращения мышц, вызывающих морщины при нахмуривании. Это расслабление мышц носит временный характер и постепенно проходит. У некоторых людей возникает беспокойство при появлении морщин на лице.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к лечащему врачу.

2. О чем следует знать перед применением препарата Диспорт®

Противопоказания

Не применяйте препарат Диспорт®

- Если у Вас имеется аллергия на ботулинический токсин типа А – гемагглютинин комплекс или любой другой компонент данного препарата (компоненты указаны в разделе 6).
- Если Вам менее 18 лет.

Особые указания и меры предосторожности

Проконсультируйтесь со своим врачом перед использованием препарата Диспорт®, если:

- у Вас имеются проблемы с глотанием;
- у Вас в анамнезе был бронхит, пневмония или проблемы с дыханием;
- у Вас наблюдалась аллергическая реакция на ботулотоксин в прошлом;
- у Вас есть другие проблемы или заболевания, влияющие на состояние Ваших мышц, например миастения гравис;
- у Вас часто возникают кровотечения;
- у Вас возникла инфекция или отек в месте инъекции;
- мышцы в предполагаемом месте инъекции слабые или имеют признаки истощения;
- Вы перенесли операцию на лице или в ближайшее время собираетесь перенести операцию на лице или другие виды операций (если вы рассматриваете возможность лечения межбровных морщин или морщин в углах глаз);
- у Вас не наблюдалось значительного улучшения внешнего вида морщин после последней процедуры (если вы рассматриваете лечение межбровных морщин или морщин в углах глаз).

При использовании препарата Диспорт® для лечения постоянных мышечных спазмов век и лица или для улучшения внешнего вида межбровных морщин и/или морщин в углах глаз может возникнуть сухость глаз. Ботулинический токсин типа А – гемагглютинин комплекс может способствовать тому, что глаза будут реже моргать или вырабатывать меньше слез, что может вызвать повреждение поверхности Ваших глаз (см. раздел 4).

При назначении препарата Диспорт® следует учитывать, что единицы действия препарата являются специфическими и не могут сравниваться с таковыми других препаратов, содержащих ботулинический токсин.

Особые указания при утилизации

Сразу же после проведения инъекций оставшийся во флаконе или в шприце раствор следует инактивировать раствором гипохлорита натрия, содержащим 1 % активного хлора. Все вспомогательные материалы, находившиеся в контакте с препаратом, должны быть утилизированы в соответствии со стандартной больничной практикой.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 23.07.2025 № 18369
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Пролитый препарат должен быть вытерт абсорбирующей салфеткой, смоченной в 1 % растворе гипохлорита натрия. Данный препарат/раствор также может быть инактивирован при помощи автоклавирования; минимальная температура 121 °C.

Дети и подростки

Препарат Диспорт® не показан для лечения гиперкинетических морщин у пациентов в возрасте до 18 лет.

Другие препараты и препарат Диспорт®

Сообщите своему врачу, если Вы принимаете какие-либо антибиотики от инфекции (например, аминогликозиды, такие как гентамицин или амикацин) или препараты, расслабляющие мышцы (миорелаксанты). Некоторые из этих лекарств могут усиливать действие ботулинического токсина типа А – гемагглютинин комплекса.

Сообщите своему врачу, если Вы принимаете, недавно принимали или можете принимать любые другие препараты включая препараты, продаваемые без рецепта.

Беременность, грудное вскармливание и фертильность

Препарат Диспорт® не рекомендуется применять во время беременности, если в этом нет явной необходимости.

Препарат также не рекомендован кормящим женщинам.

Ботулинический токсин типа А – гемагглютинин комплекс может повлиять на фертильность при введении в высоких дозах.

Если Вы беременны или кормите грудью, а также если имеется вероятность того, что Вы беременны или планируете ребенка, проконсультируйтесь с врачом перед применением данного препарата.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Существует потенциальный риск развития мышечной слабости или нарушения зрения, что может временно снизить способность управлять транспортными средствами и другими механизмами. При проявлении данных эффектов следует воздержаться от управления транспортным средством и от работы с механизмами.

3. Применение препарата Диспорт®

Всегда применяйте препарат Диспорт® в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки

Препарат Диспорт® должен вводиться только врачами или практикующими медицинскими работниками, обладающими специальными навыками и опытом применения препарата.

Ваш лечащий врач выберет Вам дозу препарата, концентрацию для разведения и решит, как часто Вам нужно применять лечение. Это будет зависеть от того, по какому показанию Вы получаете данный препарат.

Рекомендованные дозы являются специфическими для препарата Диспорт® и не могут использоваться для других препаратов, содержащих ботулинический токсин типа А-гемагглютинин комплекса.

Флакон препарата Диспорт® должен быть использован только для Вас и только для одного сеанса лечения.

Рекомендованная доза

<u>Блефароспазм и гемифациальный спазм у взрослых</u>

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 23.07.2025 № 18369
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

В случае лечения блефароспазма первая инъекция обычно составляет 40 ЕД на глаз. Препарат вводится под кожу в различных местах вокруг глаза. Если поражен только один глаз, врач будет делать инъекции препарата Диспорт® только вокруг пораженного глаза. Клиническое улучшение наблюдается в течение 2–4 дней, а максимальный эффект достигается в течение 2 недель. Инъекции выполняются примерно каждые 12 недель, в зависимости от продолжительности эффекта, но не чаще, чем каждые 12 недель. При следующих визитах количество вводимого препарата может быть увеличено максимум до 120 ЕД на глаз.

В случае лечения гемифациального спазма врач или медицинский работник сделает Вам инъекцию в пораженную сторону лица. Первая инъекция обычно составляет 40 ЕД. Инъекции выполняются примерно каждые 12 недель, в зависимости от продолжительности эффекта, но не чаще, чем каждые 12 недель. При следующих визитах количество вводимого препарата может быть увеличено максимум до 120 ЕД.

Гипергидроз подмышечной области

Первая доза обычно составляет 100 ЕД на подмышечную впадину. Врач может разделить количество препарата между пораженными областями. Облегчение симптомов обычно наступает в течение 2 недель, а эффект может длиться примерно до 48 недель. Объем следующей дозы, которую введет Вам врач, и время, в которое Вам сделают следующую инъекцию, будут зависеть от вашей реакции. Минимальный промежуток времени между инъекциями составляет 12 недель. Максимальная вводимая доза составляет 200 ЕД на одну подмышечную впадину.

Временное улучшение внешнего вида гиперкинетических складок (мимических морщин) лица от умеренной до выраженной степени у взрослых пациентов моложе 65 лет, когда выраженность этих морщин оказывает серьезное психологическое влияние на пациента

Препарат Диспорт® должен вводиться только врачами или практикующими медицинскими работниками, имеющими соответствующую квалификацию и опыт в данном виде лечения и располагающими необходимым оборудованием.

Ваш врач или медицинский работник подготовит препарат и произведет инъекцию. Флакон препарата должен быть использован только для Вас и только для одного сеанса лечения.

Межбровная область

Для коррекции вертикальных складок в межбровной области инъекции препарата производятся в мышцу, сморщивающую бровь (*m. corrugator supercilii)* по 8–10 ЕД на 2–4 точки и в мышцу гордецов (*m. procerus*) по 5–10 ЕД в 2 точки. Суммарная доза составляет от 42 до 100 ЕД.

Область лба

Устранение гиперкинетических складок в области лба производится путем введения препарата в область максимального напряжения лобной мышцы (*m. frontalis)*. Количество точек введения может быть произвольным. Все они должны располагаться на 2 см выше линии бровей, на одной линии или V-образно. Оптимальная суммарная доза препарата Диспорт® в этой области составляет 30–40 ЕД из расчета по 5–15 ЕД на одну точку, общее количество точек 4–6. Максимальная суммарная доза – 90 ЕД.

Область наружного угла глаза

Коррекция складок в области наружного угла глаза («гусиные лапки») осуществляется подкожным введением в точки, расположенные на 1 см латеральнее от наружного угла глаза, из расчета 5–15 ЕД препарата Диспорт® на одну точку введения. Количество точек от 2 до 4 на каждый глаз. Максимальная рекомендуемая суммарная доза на обе стороны составляет 120 ЕД.

Область спинки носа

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 23.07.2025 № 18369
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Для коррекции морщин в области спинки носа инъекции осуществляются в середину брюшка носовых мышц. Доза распределяется по 5–10 ЕД на 1–2 точки в каждую мышцу.

Эффект на мимические мышцы лица клинически проявляется на 2–3 день после введения и достигает максимума на 14–15 день. Рекомендуемые дозы препарата Диспорт® для использования в эстетической медицине не вызывают системных нежелательных реакций.

Применение у детей и подростков

Препарат Диспорт® не показан для лечения гиперкинетических морщин у пациентов в возрасте до 18 лет.

Если вам ввели больше препарата Диспорт®, чем следовало

Если вам ввели больше ботулинического токсина типа А – гемагглютинин комплекса, чем нужно, в мышцах, кроме тех, в которые была сделана инъекция, может начать чувствоваться слабость. Симптомы передозировки могут проявляться не сразу после инъекции.

В случае передозировки Вы должны находиться под медицинским контролем в течение нескольких недель с целью наблюдения возможных симптомов увеличения мышечной слабости или мышечного паралича.

Если это все же произойдет, немедленно обратитесь к своему врачу. Обратитесь за неотложной медицинской помощью, если вам трудно дышать, глотать или говорить.

В случае передозировки Вы будете находиться под медицинским контролем в течение нескольких недель с целью наблюдения возможных симптомов увеличения мышечной слабости или мышечного паралича.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат Диспорт® может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Немедленно обратитесь за медицинской помощью в случае возникновения одного из следующих симптомов серьезных нежелательных реакций:

- у Вас возникли любые проблемы с глотанием, дыханием или речью, а также усиление мышечной слабости;
- у Вас возникло затруднение дыхания с отеком лица, губ, языка и/или горла или без него, покраснение кожи или зудящая бугристая сыпь (крапивница). Это может означать, что у Вас аллергическая реакция на ботулотоксин типа А.

Другие возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при приеме препарата Диспорт.

Некоторые побочные эффекты могут возникать у любых пациентов, применяющих препарат Диспорт®, в то время как другие нежелательные реакции могут зависеть от заболевания, в связи с которым вводится препарат.

Блефароспазм и гемифациальный спазм у взрослых

Очень часто (могут возникать более чем у 1 человека из 10):

- опущение верхнего века

Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10):

- диплопия
- отек век
- слабость мышц лица

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 23.07.2025 № 18369
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

- сухость глаз или повышенное слезоотделение

Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):

- парез лицевого нерва

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1 000):

- трудности при движении глаз
- край века, повернутый к глазному яблоку (заворот)

Временное улучшение внешнего вида гиперкинетических складок (мимических морщин) лица от умеренной до выраженной степени у взрослых пациентов моложе 65 лет, когда выраженность этих морщин оказывает серьезное психологическое влияние на пациента

Очень часто (могут возникать более чем у 1 человека из 10):

- покраснение, отек, раздражение, сыпь, зуд, покалывание, боль, дискомфорт, жжение или синяки в месте инъекции
- головная боль

Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10):

- усталость глаз или затуманенное зрение, опущение верхнего века, отек века, слезотечение, сухость глаз, подергивание мышц вокруг глаз
- временный парез лицевого нерва

Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):

- нарушение, нечеткость зрения или диплопия
- головокружение

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1 000):

- зудящая бугристая сыпь (крапивница)
- нарушения движения глаз

Область наружного угла глаза

Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10):

- головная боль
- временный парез лицевого нерва
- отек век
- опущение верхнего века
- синяки, зуд и припухлость вокруг глаз

Нечасто (могут возникать не более чем у 1 человека из 100):

- сухость в глазах

Как правило эти побочные эффекты после лечения межбровных морщин или морщин в углах глаз возникали в течение первой недели после инъекций и длились недолго. Обычно их степень выраженности была от легкой до умеренной.

Гипергидроз подмышечной области

Часто (могут возникать не более чем у 1 человека из 10):

- повышенное потоотделение в других частях тела (компенсаторное потоотделение)

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 23.07.2025 № 18369
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Опыт пострегистрационного применения

С неизвестной частотой сообщалось о гиперчувствительности, гипестезии и мышечной атрофии.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения Российской Федерации

Адрес: 109012, Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1

Телефон: +7 (800) 550–99–03

Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru

Сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: https://roszdravnadzor.gov.ru/

Республика Беларусь

УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

Адрес: 220037, г. Минск, Товарищеский пер., д. 2а.

Телефон: + 375-17-231-85-14

Факс: + 375-17-252-53-58

Телефон отдела фармаконадзора: + 375 (17) 242 00 29

Электронная почта: rcpl@rceth.by, rceth@rceth.by

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.rceth.by

5. Хранение препарата Диспорт®

Храните лекарственный препарат в недоступном для детей месте.

Не применяйте препарат по истечении срока годности, указанного на картонной пачке после пометки «Годен до». Датой окончания срока годности является на последний день данного месяца.

Транспортировать при температуре от –22 до 8 °С. Хранить при температуре от 2 до 8 °С.

Восстановленный раствор

Восстановленный раствор хранить не более 24 часов при температуре 2–8 °С.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Препарат Диспорт® содержит

Действующим веществом является ботулинический токсин типа А – гемагглютинин комплекс.

Каждый флакон содержит 125 ЕД действующего вещества.

Вспомогательными веществами препарата Диспорт® являются альбумин человека и лактозы моногидрат.

Перед введением препарат Диспорт® растворяют в 0,9% растворе натрия хлорида для инъекций.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 23.07.2025 № 18369
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Внешний вид препарата Диспорт® и содержимое упаковки

Лиофилизат

Лиофилизат белого цвета без посторонних включений.

Восстановленный раствор

Прозрачный, бесцветный раствор, без посторонних включений.

По 125 ЕД в стеклянном флаконе, укупоренном резиновой пробкой под алюминиевой обкаткой с отверстием для иглы в центре и закрытом защитной пластмассовой крышкой контроля первого вскрытия.

1 флакон, зафиксированный в держателе из картона вместе с инструкцией по применению, помещают в пачку картонную.

Держатель регистрационного удостоверения

Франция

Ипсен Фарма

65 набережная Жорж Горс, 92100, Булонь Бийанкур

Телефон: +33 (0)1 58 33 50 00

Факс: +33 (0)1 58 33 50 01

Электронная почта: corporate.communications@ipsen.com

Производитель

Великобритания

Ипсен Биофарм Лимитед

Ash Road Wrexham Industrial Estate

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к представителю держателя регистрационного удостоверения:

Российская Федерация

ООО «ИПСЕН»

109147, г. Москва, улица Таганская, д, 17–23.

Телефон: +7 (495) 258–54–00.

Факс: +7 (495) 258–54–01.

Электронная почта: ipsen.moscow@ipsen.com

Листок-вкладыш пересмотрен:

Прочие источники информации

Подробные сведения о данном препарате содержатся на веб-сайте Союза http://eec.eaeunion.org/.

(линия отрыва или отреза)

Следующие сведения предназначены исключительно для медицинских работников:

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 23.07.2025 № 18369
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

Специальные предосторожности при обработке остатков раствора препарата и другие предостережения

При приготовлении раствора препарата Диспорт® и обращении с ним рекомендуется пользоваться перчатками. При попадании лиофилизата или восстановленного раствора на кожу или слизистые оболочки их следует тщательно промыть водой. Чтобы минимизировать возможные риски при разведении препарата, приготовление раствора препарата Диспорт® должно проводиться в специализированных медицинских учреждениях персоналом, имеющим опыт работы с ботулиническим токсином.

Необходимо строго следовать инструкции по применению препарата, обращению с ним и его утилизации.

Разведение препарата должно проводиться в соответствии с правилами Надлежащей Производственной Практики, особенно в отношении соблюдения асептических условий.

Для разведения препарата Диспорт необходимо использовать 0,9% раствор натрия хлорида для инъекций.

Согласно приведенной ниже таблице разведения, необходимое количество раствора натрия хлорида для инъекций 9 мг/мл (0,9%) следует набрать в шприц для получения восстановленного прозрачного и бесцветного раствора следующей концентрации:

Полученная доза в ЕД/мл Количество растворителя (0,9 % раствора натрия хлорида для инъекций)

100 ЕД/мл* (или 10 ЕД/0,1 мл) 1,25 мл*

200 ЕД/мл (или 10 ЕД/0,05 мл) 0,63 мл

* Это разведение препарата Диспорт® 125 ЕД является альтернативой только для лечения мимических морщин.

Точное дозирование 0,63 мл или 1,25 мл может быть выполнено с помощью шприцев, градуированных с шагом 0,1 мл и 0,01 мл.

Рекомендации по утилизации загрязненного сырья

Сразу после использования и перед утилизацией неиспользованный восстановленный препарат Диспорт (во флаконе или в шприце) следует инактивировать 2 мл разведенного раствора гипохлорита натрия 0,55% или 1% (раствор Дакина).

Использованные флаконы, шприцы и материалы нельзя опорожнять, их следует помещать в специальные контейнеры и утилизировать в соответствии принятыми требованиями.

Рекомендации на случай возникновения каких-либо инцидентов при работе с ботулиническим токсином

- Любые разливы препарата должны быть ликвидированы: либо с помощью абсорбирующего материала, пропитанного раствором гипохлорита натрия (отбеливателя), если речь идет о порошке, либо с помощью сухого абсорбирующего материала, если речь идет о восстановленном препарате.
- Загрязненные поверхности следует очистить с помощью абсорбирующего материала, пропитанного раствором гипохлорита натрия (отбеливателя), а затем высушить.
- Если флакон разбился, действуйте, как указано выше: аккуратно соберите осколки разбитого стекла и вытрите препарат, избегая порезов кожи.
- При попадании препарата на кожу промойте пораженный участок раствором гипохлорита натрия (отбеливателя), затем обильно промойте водой.
- При попадании препарата в глаза тщательно промойте их большим количеством воды

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 23.07.2025 № 18369
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0002)

или офтальмологическим раствором для промывания глаз.

- При попадании препарата на рану, порез или поврежденную кожу тщательно промойте ее большим количеством воды и примите надлежащие медицинские меры в зависимости от попавшей дозы.

Необходимо неукоснительно следовать данным инструкциям по применению, обращению и утилизации препарата.Описание восстановленного раствора: прозрачный, бесцветный раствор, без посторонних включений.

Инструкции по приготовлению раствора

Для каждого показания к применению необходимые концентрации специфичны, и не взаимозаменяемы с другими препаратами ботулотоксина.

Блефароспазм и гемифациальный спазм у взрослых

При лечении блефароспазма и гемифациального спазма 125 ЕД препарата разводят 0,63 мл 0,9% раствора натрия хлорида для инъекций, чтобы получить раствор с концентрацией 200 ЕД в 1 мл. Препарат Диспорт® вводят путем подкожной инъекции медиально и латерально в область соединения между пресептальной и глазничной частями верхней и нижней частей круговых мышц глаза.

Гипергидроз подмышечной области

При лечении гипергидроза подмышечной области 125 ЕД препарата разводят 0,63 мл 0,9 % раствора натрия хлорида для инъекций, чтобы получить раствор с концентрацией 200 ЕД в 1 мл.

Временное улучшение внешнего вида гиперкинетических складок (мимических морщин) лица от умеренной до выраженной степени у взрослых пациентов моложе 65 лет

Препарат Диспорт® разводят до получения концентрации 200 ЕД/мл (см. таблицу ниже).

Полученная доза в ЕД/мл	Количество растворителя (0,9 % раствора натрия хлорида для инъекций)
100 ЕД/мл* (или 10 ЕД/0,1 мл)	1,25 мл*
200 ЕД/мл (или 10 ЕД/0,05 мл)	0,63 мл

Для получения дополнительной информации смотрите раздел 4.2 «Режим дозирования и способ применения» и раздел 6.6 «Особые меры предосторожности при уничтожении использованного лекарственного препарата или отходов, полученных после применения лекарственного препарата, и другие манипуляции с препаратом» в общей характеристике лекарственного препарата.

Условия по обработке остатков растворов препарата

Сразу же после проведения инъекции оставшийся во флаконе или в шприце раствор следует инактивировать разбавленным раствором гипохлорита натрия (содержащем 1 % активного хлора). Все вспомогательные материалы, находившиеся в контакте с препаратом, должны быть утилизированы в соответствии со стандартной больничной практикой.

Пролитый препарат Диспорт® следует вытереть абсорбирующей тканью, смоченной в разбавленном растворе гипохлорита натрия.